

DESINFEKTIONSPLAN

für den Kindergarten – Noro-Viren –



Noroviren sind bereits ab 2 Erkrankungen meldepflichtig gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz.
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflicht gem. § 34 Infektionsschutzgesetz.

Die Eltern aller Kinder sollten über die aufgetretene Durchfallerkrankung informiert werden. Das erkrankte Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern möglichst getrennt von den übrigen Kindern zu betreuen. Die Person, die das erkrankte Kind betreut, sollte nicht in die Essenzubereitung und -verteilung eingebunden werden. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt sind, dürfen eine Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen.

	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION/ EINWIRKZEIT	WIE	WER
<p>Haut/Hände Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion	Nach Kontakt mit erkrankten Kindern. Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem. Nach Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und Flächen. Mehrmals täglich. Bei Bedarf.	ASEPTOMAN VIRAL	Konz. - 1 Min.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
<p>Flächen</p>	Fieberthermometer	Direkt nach Gebrauch.	DESOMED RAPID PUR	Konz. 1 Min.	Mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch vollständig abwischen.	Alle Mitarbeiter
	Spielzeug	Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	DESOMED RAPID PUR ULTRASOL ACTIVE	Konz. - 1 Min. 1 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.	Alle Mitarbeiter
	Wickeltischauflage	Nach Gebrauch.	DESOMED RAPID PUR	Konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Alle Kontaktflächen, z.B. Türgriffe, Arbeitsflächen, Wickeltisch	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	DESOMED RAPID PUR ULTRASOL ACTIVE	Konz. - 1 Min. 1 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Fußböden	Täglich. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	ULTRASOL ACTIVE	1 % - 60 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Toilette, Waschbecken	Täglich. Nach jeder Toilettennutzung durch ein erkranktes Kind. Sofort nach Verschmutzung mit Erbrochenem und/oder Ausscheidungen.	DESOMED RAPID PUR	Konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
Sonstiges	Geschirr und Besteck	Nach Benutzung.			Maschinelle Aufbereitung bei mindestens 60 °C.	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung: Chemikaliendichte Schutzhandschuhe Einmalhandschuhe PE-Schürze	Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Beim Umgang mit Ausscheidungen, Blut und Erbrochenem. Bei Bedarf. Falls die Arbeitskleidung durchnässt oder kontaminiert werden kann.			Nach Gebrauch entsorgen.	Alle Mitarbeiter

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im **D-WIPES** Spendersystem eingesetzt werden.

Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden (Hände: **ASEPTOMAN VIRAL**, Flächen: **DESOMED PERFEKT**).

Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.