



Desinfektionsplan Wohn- & Pflegebereich

Dr. Schumacher

PSP-000702 01/2014

	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION/ EINWIRKZEIT	WIE	WER		
 Haut & Hände Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Zu Arbeitsbeginn. Am Arbeitsende. Vor allen pflegerischen Maßnahmen am Bewohner. Vor dem Vorbereiten von Medikamenten/ Infusionen. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Bei Bedarf.	ASEPTOMAN® PARFÜMFREI DESCODERM	Konz. 30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter		
	Hautdesinfektion	Vor allen invasiven, d. h. hautdurchtrennenden Eingriffen (z. B. Injektionen).	ASEPTODERM	Talgdrüsenarme Haut Konz. 15 Sek. Talgdrüsenreiche Haut Konz. 10 Min.	Punktionsstelle satt einsprühen. Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Pflegepersonal		
	Schleimhautantiseptik	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen, z. B. Katheterisierung.	Schleimhautantiseptikum	Talgdrüsenreiche Haut Konz. 3 Min.	Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Pflegepersonal		
 Haut & Hände Reinigung	Händewaschung	Zu Arbeitsbeginn. Bei Verschmutzung. Bei Bedarf.	DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN KAMILLENDUFT		Waschlotion aus Direktspender in die Hände geben, mit lauwarmem Wasser aufschäumen und Hände gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen. Anschließend mit Einmalhandtüchern Hände sorgfältig trocknen.	Alle Mitarbeiter		
 Haut & Hände Pflege	Hautpflege	In der Pause. Bei Arbeitsende. Bei Bedarf.	BIALIND		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.	Alle Mitarbeiter		
	Hautschutz	Zu Arbeitsbeginn. Vor dem längeren Tragen von Handschuhen. Nach Pausen.	DESOLIND Protect <i>prolind</i> Hautschutzcreme		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze besonders berücksichtigen.	Alle Mitarbeiter		
 Instrumente	Instrumentendesinfektion	Nach Gebrauch.	DESCOTON® EXTRA	2,0 % - 30 Min.	Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Staubgeschützt aufbewahren. Einmalinstrumente sind nach Gebrauch zu entsorgen.	Pflegepersonal		
	Med./techn. Geräte Fieberthermometer Blutdruckmanschetten Stethoskop Infusionsständer	Nach Gebrauch.	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal		
 Fläche	Pflegewagen Transportwagen	Wöchentlich. Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal		
	Arbeitsfläche zum Stellen von Medikamenten	Vor dem Stellen von Medikamenten.	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal		
	Medikamentenkühlschrank, innen Medikamentenschrank, innen	Monatlich. Bei Bedarf. (Medikamentenkühlschrank mind. 1/2jährlich abtauen)	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal		
	Sonstige Oberflächen und Handkontaktflächen, z. B.: Arbeitsflächen, Türgriffe, Handläufe	Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal		
	Flächen im Bewohnerzimmer, z. B.: Nachtschrank, Bettgestell, Matratzenschonbezug	Sofort nach Kontamination. Bei Bewohnerwechsel. Bei Bedarf.	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal		
	Sanitärbereich, z. B.: Toiletten, Waschbecken	Arbeitstäglich. Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOCEPT PUR BIGUANID FLÄCHE N	Konz. 1 Min. 0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal		
	Fußboden	Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.	BIGUANID FLÄCHE N	0,5 % - 30 Min. 1,0 % - 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, z.B. mit Bezugs-Wechsel-Methode. Nicht nachtrocknen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal		
Schutzkleidung, Abfälle	Chemikaliendichte Schutzhandschuhe Einmalhandschuhe	Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Bei jedem Kontakt mit infektiösen Bewohnern. Bei Kontakt mit Körperausscheidungen.			Einmalprodukte sind nach Gebrauch zu entsorgen.	Pflegepersonal		
	OP-Mund-Nasen-Schutz	Wenn Aerosole entstehen können (z. B., wenn Bewohner erbrechen). Vor dem Umgang mit Durchfällen und Erbrochenem (Eigenschutz).						
	Schutzkittel	Wenn die Gefahr besteht, dass die Arbeitskleidung des Personals kontaminiert werden kann.						
	Plastikeinmalschürze Schutzbrille	Wenn mit Durchfeuchtung der Kleidung zu rechnen ist. Bei Spritzgefahr.						
	Abfälle						Abfälle täglich entsorgen. Mit Blut, Sekreten, Exkreten kontaminierte Abfälle im reißfesten Müllbeutel, ohne Umfüllen und Sortieren entsorgen. Spitze oder scharfe Gegenstände in stich- und bruchsicheren Einwegbehältnissen sammeln und fest verschlossen entsorgen.	Pflegepersonal

- Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.
- **Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im Eco WIPES Spendersystem eingesetzt werden.**
- Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
- Vor Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung mit einem nicht ionischen Reiniger zu empfehlen.
- Schmuck an Händen und Unterarmen ist vor der Arbeit abzulegen.
- Beim Umgang mit Blut, Fäkalien, Auswurf sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen.
- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.
- Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden (Hände: **ASEPTOMAN® VIRAL**, Flächen: **OPTISEPT®**).
- Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion sind vorgeschrieben (BGR 250/BGV A1). Dies ist schriftlich zu dokumentieren.
- Der aktuelle Stand des Desinfektionsplanes ist regelmäßig zu überprüfen.

Die Berufsgenossenschaftliche Regel 250 und die RKI-Empfehlungen müssen berücksichtigt werden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld

Telefon: +49 5664 9496-0

Email: post@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Stempel/Unterschrift



Desinfektionsplan Wohn- & Pflegebereich

Dr. Schumacher

PSP-000702 01/2014

	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION/ EINWIRKZEIT	WIE	WER
 Haut & Hände Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Zu Arbeitsbeginn. Am Arbeitsende. Vor allen pflegerischen Maßnahmen am Bewohner. Vor dem Vorbereiten von Medikamenten/ Infusionen. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Bei Bedarf.			Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
	Hautdesinfektion	Vor allen invasiven, d. h. hautdurchtrennenden Eingriffen (z. B. Injektionen).			Punktionsstelle satt einsprühen. Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Pflegepersonal
	Schleimhautantiseptik	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen, z. B. Katheterisierung.			Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.	Pflegepersonal
 Haut & Hände Reinigung	Händewaschung	Zu Arbeitsbeginn. Bei Verschmutzung. Bei Bedarf.			Waschlotion aus Direktspender in die Hände geben, mit lauwarmem Wasser aufschäumen und Hände gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen. Anschließend mit Einmalhandtüchern Hände sorgfältig trocknen.	Alle Mitarbeiter
 Haut & Hände Pflege	Hautpflege	In der Pause. Bei Arbeitsende. Bei Bedarf.			Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Handgelenke, Finger, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze beachten.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Zu Arbeitsbeginn. Vor dem längeren Tragen von Handschuhen. Nach Pausen.			Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und Nagelfalze besonders berücksichtigen.	Alle Mitarbeiter
 Instrumente	Instrumentendesinfektion	Nach Gebrauch.			Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Staubgeschützt aufbewahren. Einmalinstrumente sind nach Gebrauch zu entsorgen.	Pflegepersonal
	Med./techn. Geräte Fieberthermometer Blutdruckmanschetten Stethoskop Infusionsständer	Nach Gebrauch.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal
 Fläche	Pflegewagen Transportwagen	Wöchentlich. Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal
	Arbeitsfläche zum Stellen von Medikamenten	Vor dem Stellen von Medikamenten.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal
	Medikamentenkühlschrank, innen Medikamentenschrank, innen	Monatlich. Bei Bedarf. (Medikamentenkühlschrank mind. 1/2jährlich abtauen)			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Pflegepersonal
	Sonstige Oberflächen und Hand- kontaktflächen, z. B.: Arbeits- flächen, Türgriffe, Handläufe	Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal
	Flächen im Bewohnerzimmer, z. B.: Nachtschrank, Bettgestell, Matratzenschonbezug	Sofort nach Kontamination. Bei Bewohnerwechsel. Bei Bedarf.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal
	Sanitärbereich, z. B.: Toiletten, Waschbecken	Arbeitstäglich. Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.			Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal
	Fußboden	Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.			Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, z.B. mit Bezugs-Wechsel-Methode. Nicht nachtrocknen.	Reinigungspersonal Pflegepersonal
 Schutzkleidung, Abfälle	Chemikaliendichte Schutzhandschuhe Einmalhandschuhe	Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Bei jedem Kontakt mit infektiösen Bewohnern. Bei Kontakt mit Körperausscheidungen.			Einmalprodukte sind nach Gebrauch zu entsorgen.	Pflegepersonal
	OP-Mund-Nasen-Schutz	Wenn Aerosole entstehen können (z. B., wenn Bewohner erbrechen). Vor dem Umgang mit Durchfällen und Erbrochenem (Eigenschutz).				
	Schutzkittel	Wenn die Gefahr besteht, dass die Arbeitskleidung des Personals kontaminiert werden kann.				
	Plastikeinmalschürze	Wenn mit Durchfeuchtung der Kleidung zu rechnen ist.				
	Schutzbrille	Bei Spritzgefahr.				
	Abfälle					

- Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.
- Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
- Vor Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung mit einem nicht ionischen Reiniger zu empfehlen.
- Schmuck an Händen und Unterarmen ist vor der Arbeit abzulegen.
- Beim Umgang mit Blut, Fäkalien, Auswurf sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen.
- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.
- Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden.
- Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion sind vorgeschrieben (BGR 250/BGV A1). Dies ist schriftlich zu dokumentieren.
- Der aktuelle Stand des Desinfektionsplanes ist regelmäßig zu überprüfen.

Die Berufsgenossenschaftliche Regel 250 und die RKI-Empfehlungen müssen berücksichtigt werden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld

Telefon: +49 5664 9496-0

Email: post@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Stempel/Unterschrift